



Az alkoholos állapot fizikális jelei (alkoholos lehelet, arcbőr, kötőhártyák állapota stb.) és psychés tünetek (beszéd, magatartás, tájékozódás, emlékezőképesség stb.):

A külsérelmi nyomok (sebek) helye: alakja, hossza, szélessége, mélysége (a lehetőséghez képest mm, cm pontossággal), a sebszétek, sebzugok, sebfal, sebalap, sebkörnyezet (szennyeződések) leírása: lövési, szúrási sérülés esetében a sérülés be- és kimeneti nyílásának tápsíktól mért távolsága (több külsérelmi nyom esetében azokat festtájanként vagy fix anatómiai ponthoz viszonyítva folytatódólagosan sorszámozva kell felsorolni): Mk. szem körül hematoma. Fejtetőm elől 2 Ft-nyi horzsolás Tarkótájékon ocsesapótyvérnyi területen kitépték a hálix haját. Nyakombon a trigonum caroticumnak megf. 3x1 cm-es livid terület. J. vállján 8x cm-es livid terület. J. tomporon 8x4 cm-es livid terület. Hátán benn a X-es borda magasságában fájlalja. B. térdén 1x3 cm-es liv. terület. B. sincipitja nyomásra érzékeny.

A szakorvosi leletek (rtg. stb.) részletes feltüntetése: Rtg., Neurologiai konzilium lsd.melléklet.

A sérült ellátása (gyógykezelés, kötés, műtét, rendelőintézetbe, fekvőbeteg-gyógyintézetbe irányítása stb.):

Kórházi gyógykezelés., Rtg., neurol.cons. Át.,

A kórisma (magyarul és latinul): MMX Comm.cer., Agyrázkódás, Cont.faciei, A szemhéj és szemkörüli terület duzzadása,

Vélemény: A gyógytartam szövödménymentes gyógyulás esetén előreláthatólag 8 napon belüli – 8 napon túli, kb. \_\_\_\_\_ nap.

Megjegyzés: (pl. várható-e maradandó testi fogyatékoság vagy súlyos egészségromlás):

Esztergom

19 99.


év.

április

hó

20.

nap.



Zsoldos László oszt. orvos.

aláírás

\*A nem kívánt szöveget törölni kell.

A fénymásolat az eredetivel \_\_\_\_\_ megegyezik.

Esztergom 2000.05.

